

**Upravni odjel za poljoprivrednu i turizam  
Međimurska županija  
Rudera Boškovića 2  
40000 Čakovec**


**IZVJEŠĆE PROJEKTA  
KONTROLA PLODNOSTI TLA  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
2023.**

**LABOSAN d.o.o.**

J.J. Strssmayera 106, 33 000 VIROVITICA, HRVATSKA  
Tel. +385-1-4-811-583, Fax. +385-1-4-811-669

**Laboratorij Virovitica**

J.J. Strssmayera 106, 33 000 VIROVITICA, HRVATSKA  
Tel. +385-33-840-138

	Ime i prezime	Datum	Potpis
Izradio:	Damir Baotić, mag.ing.agr.	2023-12-30	

## 1. O projektu

Projekt *Kontrola plodnosti tla* provodi se na području Međimurske županije od 2014. godine. U njemu je dosad sudjelovalo 16 općina i 3 grada, od 2018. godine uzorkovano je i obrađeno preko 3200 uzoraka, na ukupnoj površini većoj od 3.500 ha.

Projekt je postavljen kao sporazum između Županije i jedinica lokalne samouprave te poljoprivrednih proizvođača, a troškove projekta snose svi sudionici u omjeru 40:40:20.

Projekt ima više ciljeva i svrha ali ukratko možemo nabrojiti neke od najvažnijih, a to su utvrđivanje plodnosti zemljišta, racionalizacija proizvodnje, očuvanje i popravak poljoprivrednog zemljišta, zaštita okoliša, povećanje prinosa i kvalitete proizvoda.

Ciljevi koji su nabrojani realizirati se mogu jedino uz pomoć svih sudionika u ovom projektu: jedinice lokalne samouprave, poljoprivrednih proizvođača i izvoditelj projekta.

Projekt se provodi na način da, nakon što se javnim pozivom odaberu prijavljeni korisnici, terenska služba Labosan d.o.o. u dogovoru s korisnicima prvo provodi **uzimanje uzoraka**. Uzorci se dostavljaju u laboratorij tvrtke Labosan d.o.o. i podvrgnuti su **kemijskoj analizi** gdje se utvrđuju kemijsko-fizikalna svojstva tla koja su uz ostale indikatore, podloga za interpretaciju rezultata koja je izražena kroz **gnojidbene preporuke**. Osim gnojidbene preporuke, tu je i **preporuka za agrotehničke mjere popravka tla** ukoliko je to potrebno. Podaci obrađenih uzoraka uvrštavaju se u **interpretacijsku bazu i karte** koje mogu biti podloga za daljnja istraživanja i alat za donošenje mjera u poljoprivrednoj politici JLS-a.

**Kontrola plodnosti tla osnovni je preduvjet za održivo upravljanje zemljištem i strateška komponenta održivog razvoja.** Kako je naša poljoprivreda još uvijek pretežito primarnog karaktera, kvaliteta života i mogućnost ekonomskog razvoja poljoprivrednih proizvođača izravno su povezani s plodnošću tla i veličinom zemljišnih resursa. Stoga je rast proizvodnje hrane, uz zadržavanje i povećanje ekoloških funkcija zemljišta moguć, ali samo ako se zemljišni resursi koriste na odgovarajući način, a za takav odgovoran pristup potrebno je i znanje i učinkovit nadzor.

## **2. Materijal i metode**

Sustav kontrole plodnosti tla uključuje sve relevantne indikatore primarne organske producije te obuhvaća niz agrotehničkih (agrotehničkih, fizikalno-kemijsko-bioloških i dr.) svojstava tla kao i neke druge važne aspekte (sociološko-ekonomске i tehničko-tehničke provenijencije) biljne proizvodnje, a čine ga:

**a) uzimanje uzoraka,**

HRN ISO 10381-2

**b) laboratorijske analize**

- pH H<sub>2</sub>O i KCl ( HRN ISO 10390)
- Humus % (sulfkromna oksidacija, mokro spaljivanje, spektrofotometrijsko određivanje)
- Određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – spektrofotometrijsko određivanje
- Određivanje sadržaja lakopristupačnog kalija nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku K<sub>2</sub>O – plamenofotometrijsko određivanje
- Određivanje hidrolitičke kiselosti titracijom – modificirana metoda po Kappen-u
- Određivanje sadržaja karbonata volumetrijska metoda

**c) tumačenje rezultata analize, odnosno izrada gnojidbenih i agrotehničkih preporuka.**

- Preporuka konvencionalne gnojidbe
- Gnojidbeni materijal po izboru, potreba NPK, Preporuka NPK, raspodjela gnojidbe, N sa i bez UREA
- Preporuka integrirane gnojidbe
- Preporuka ekološke gnojidbe
- Potreba hraniva za 8 kultura koje mogu doći u plodoredu u narednim godinama i njihov očekivani prinos
- Kalcizacija (potreba Ca, CaO i karbokalk)
- Petogodišnji plan gnojbe trajnih nasada
- Kationski izmjenjivački kapacitet
- Savjeti i mišljenja

### 3. Rezultati - Međimurska županija

U 2023. godini kroz ovaj projekt uzet je i obrađen ukupno 401 uzorka tla, površina stavljena pod kontrolu plodnosti tla iznosila je 609,85 ha. U projektu je sudjelovalo 88 poljoprivrednih proizvođača iz: Općine Belica, Goričan, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Strahoninec, Sveti Martin na Muri i Grada Čakovca.

**Tablica 1.** Pregled broja korisnika, analiza i površina Međimurske županije u 2023. godini

Županija/ Grad/ Općina	Broj korisnika	Broj analiza	Ukupna površina (ha)
<b>Međimurska županija</b>	<b>88</b>	<b>401</b>	<b>609,85</b>
Općina Belica	16	137	222,10
Grad Čakovec	10	42	100,92
Općina Goričan	2	8	32,04
Općina Gornji Mihaljevec	12	34	42,05
Općina Mala Subotica	15	69	110,02
Općina Orehovica	18	66	72,00
Općina Podturen	6	30	36,26
Općina Strahoninec	2	5	13,70
Općina Sveti Martin na Muri	4	10	7,97

Prilikom uzimanja uzoraka tla, uz jedan prosječan uzorak tla, prikupljeno je 27 različitih podataka o agrotehnici, gnojidbi, zaštiti bilja, tipu proizvodnje itd. koji služe za precizniji izračun preporuke gnojidbe, a mogu se koristiti i kao statistički podaci o stanju u primarnoj biljnoj proizvodnji, te stanju poljoprivrednih gospodarstava od strane jedinica lokalne samouprave u različite svrhe. Ulaznim parametrima pridodaju se i kemijske analize tla, te nakon interpretacije rezultata dobivamo 60 različitih podataka po sloganu odnosno jednom uzorku tla.

U izvješću su iskazani najvažniji prikupljeni podaci o tlu: **1. pH – kiselost tla,**  
**2. potreba za kalcizacijom**  
**3. humus**  
**4. stanje hranjiva (fosfor, kalij)**

**Tablica 2.** Struktura veličina površina uzorkovanih proizvodno-tehnoloških cjelina (ha)  
Međimurske županije

Srednja vrijednost	Najmanja vrijednost	Najveća vrijednost
Površina (ha)	1,61	0,1

Srednja vrijednost površina parcele koja je stavljena pod program kontrole plodnosti tla u 2023. godini iznosila 1,61 ha. Na analiziranim površinama u 2024 godini najzastupljenije će biti površine pod ratarskim kulturama: kukuruz, krumpir i ozima pšenica.


**Tablica 3.** Prosjek rezultata kemijskih analiza za Međimursku županiju od 2016 do 2023 godine

Godina	pH (KCl)	pH(H <sub>2</sub> O)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (mg/100g)	K <sub>2</sub> O (mg/100g)	Humus %	Broj uzoraka
<b>2018</b>	4,83	6,12	11,18	21,02	2,05	365
<b>2019</b>	4,73	5,91	24,47	18,37	2,33	372
<b>2020</b>	5,49	6,66	26,02	15,28	2,58	733
<b>2021</b>	4,75	5,98	23,39	16,46	2,27	488
<b>2022</b>	4,95	6,16	21,31	19,12	2,22	551
<b>2023</b>	5,17	6,38	26,63	18,86	2,29	401
<b>2016-2023</b>	<b>5,12</b>	<b>6,23</b>	<b>22,21</b>	<b>17,41</b>	<b>2,35</b>	<b>3261</b>

**Tablica 4.** Prosjek rezultata kemijskih analiza za Međimursku županiju u 2023.


Županija/ Grad/ Općina	pH (KCl)	pH(H <sub>2</sub> O)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (mg/100g)	K <sub>2</sub> O (mg/100g)	Humus %	Broj uzoraka
<b>Međimurska županija</b>	<b>5,17</b>	<b>6,38</b>	<b>26,63</b>	<b>18,86</b>	<b>2,29</b>	<b>401</b>
<b>Belica</b>	4,21	5,56	28,18	20,10	1,94	137
<b>Čakovec</b>	6,03	7,09	21,23	17,49	2,55	42
<b>Goričan</b>	6,24	7,28	26,40	13,88	2,97	8
<b>Gornji Mihaljevec</b>	5,03	6,34	21,22	21,61	2,10	34
<b>Mala Subotica</b>	5,41	6,61	28,39	20,78	3,01	69
<b>Orehovica</b>	6,89	7,80	33,53	13,36	2,44	66
<b>Podturen</b>	4,38	5,70	17,07	18,73	1,68	30
<b>Strahoninec</b>	5,13	6,47	12,53	24,42	2,13	5
<b>Sveti Martin na Muri</b>	5,22	6,44	26,26	21,79	2,29	10

Tlo je danas više no ikad ugroženo brojnim procesima oštećenja. Smanjuje se njegova proizvodna sposobnost, odnosno umanjuje se potencijalni prinos usjeva. Jedan od glavnih ograničavajućih čimbenika u intenzivnoj (konvencionalnoj) primarnoj biljnoj proizvodnji u Međimurskoj županiji je kiselost tla. Iz grafikona 1. vidimo da je kod 44 % (177 uzorka) uzorkovanih i obrađenih parcela ustanovljena jako kisela reakcija tla, te kod 23 % (92 uzorka) kisela reakcija tla. Iz tablice 3. možemo vidjeti da je pH tla približan prosjeku prijašnjih godina.



**Grafikon 1.** Reakcija tla (pH u KCl)

Uspoređujući podatke između pojedinih JLS vide se značajne razlike pH vrijednosti (Grafikon 2.), a ovo se može pripisati i razlikama između pojedinih područja gdje se nalaze poljoprivredne površine. Najmanju prosječnu pH vrijednost imale su općine Podturen i Belica, gdje dominira lesivirano tlo na praporu koje je prirodno sklonog debazifikaciji i acidifikaciji. Najpovoljnija reakcija tla je bila na glejnim i aluvijalnim tipovima tla, odnosno u općinama uz rijeke.



**Grafikon 2.** Srednje vrijednosti pH (KCl) po JLS

Da bi se stvorili povoljniji uvjeti za rast biljaka i smanjili inputi mineralnog gnojiva, popravila struktura tla, itd. na kiselim tlima, preporučene su mjere popravka tla odnosno kalcizacija. Povijesni podaci govore da je tijekom 19. stoljeća, kada se kalcizaciji pristupalo napamet, nastala izreka da „*vapno čini očeve bogatim, a sinove siromašnim*“. No, ona je u novije vrijeme potisnuta spoznajama, da se uz uvjet dodatka vapna i ispravne opskrbljenosti hranjivima (gnojidba), dugoročno podiže plodnost tla. Naime, danas postoji mogućnost preciznih analiza do te mjere da se tlu mogu dodati one hranjive tvari koje mu nedostaju za uspješnu proizvodnju određenih poljoprivrednih kultura. Izbalansirana gnojidba se opravdano smatra jednom od najvažnijih agrotehničkih mjer u poljoprivrednoj proizvodnji, a određivanje doze gnojiva, njegove vrste, vremena primjene i načina gnojidbe mora se temeljiti na znanstveno-stručnim spoznajama. Kislost ili bazičnost tla (pH- potentia Hidrogeni) mjerilo je njegove plodnosti i orientacija za ispravnu gnojidbu poljoprivrednih kultura. Najčešće se u agrokemijskim laboratorijima mjeri dvije vrste pH vrijednosti: aktualna u  $H_2O$  i izmjenjiva (supstitucijska) u 1 mol dm<sup>-3</sup> KCl. Aktualna pH vrijednost ( $H_2O$ ) je posljedica prisutnosti slobodnih iona, najviše  $H^+$ ,  $Al^{3+}$  i  $OH^-$ . Oslobađanjem navedenih iona dolazi do njihove zamjene na adsorpcijskom kompleksu tla s topljivim organskim i mineralnim kiselinama ili kiselim solima te njihovom disocijacijom. Izmjenjiva pH vrijednost (KCl) određena je prisutnošću  $H^+$  iona, ali i dijelom aluminijevih i željeznih iona koji se djelovanjem neutralnih soli zamjenjuju s adsorpcijskog kompleksa tla. Izmjenjiva pH-reakcija pruža neposredan uvid u stanje adsorpcijskog kompleksa tla što ukazuje indirektno i na druge uvjete koji određuju hranidbena svojstva tla, pa je njezino određivanje uvjek sastavni dio kemijske analize tla. Kalcizacija ili vapnjenje je poznato još iz vremena rimskog carstva. Njemačka posljednjih 50 godina kontinuirano poboljšava poljoprivredna tla s više od dva milijuna tona vapna godišnje. Sve zapadnoeuropejske zemlje ostvarile su visoke prinose na svojim poljima prvenstveno zahvaljujući redovitoj kalcizaciji tla. Mjera za smanjenje kiselosti tla (niskog pH), čime se odmah poboljšava i usvajanje hranjiva iz tla, zove se kalcizacija. Obavlja se dodavanjem vapnenih materijala, odnosno materijala koji u visokom postotku sadrže kalcij. Kalcij u ovom slučaju igra ulogu regulatora plodnosti tla i smanjuje njegovu kiselost, iako je on biogeni element neophodan za normalan rast i razvoj biljaka. Kalcizacija sama po sebi neće utjecati na povećanje prinosa, ali bez nje, tamo gdje je nužno njen provođenje, također nema prinosa. Niska pH vrijednost dovodi do niza negativnih pojava u tlu. Npr. uzrokuje deficit kalcija i magnezija u tlu, a time i kvarenje strukture tla. Osim toga nizak pH uzrokuje: toksičnost aluminija i/ili mangana, smanjenu raspoloživost fosfora, nisku efikasnost gnojidbe dušikom, fosforom i kalijem uz usporen rast i razvitak biljaka, te niži prinos i lošiju kakvoću proizvoda. Stoga se kao obavezna mjera popravka kiselih tala preporuča kalcizacija, ali samo uz detaljnu kemijsku analizu tla i uvažavanje ostalih mjer popravke (humizacija, fosfatizacija, primjena mikroelemenata i dr.).


**Tablica 5.** Potreba CaO u t/ha - kalcizacija

	Srednja vrijednost	Minimalna vrijednost	Maksimalna vrijednost	Ukupna površina*	Ukupna potreba CaO**
<b>Kalcijev materijal – CaO (t)</b>	1,68	0	3,06	436,6	1072,18

\*ukupna površina preporučena za kalcizaciju (ha)

\*\*ukupna potreba CaO (t) za neutralizaciju kiselosti tla na analiziranim površinama kroz 2 do 3 godine


Bogatstvo tla trajnom organskom tvari odnosno humusom od izuzetnog je značaja za zdravlje tla, a samim time i biljaka na kojem rastu. Humus utječe na vrlo značajna kemijska i fizička svojstva tla, kao što su struktura, kapacitet za vodu, adsorpcija iona, sadržaj neophodnih elemenata itd. Isto tako humus je osnovni izvor energije za životnu aktivnost mikroorganizama tla pa bi njegovim nestankom došlo do katastrofalnih posljedica. Iako je humus stabilan, on nije statičan, već dinamičan, jer se neprestano stvara od biljnog i životinjskog otpada koji se mikroorganizmima kontinuirano razgrađuje. Pravilnim gospodarenjem tlom možemo sprječiti daljnju degradaciju tla koja je najčešće povezana sa neodgovornom poljoprivrednom aktivnošću. Kemijskom analizom tla možemo utvrditi da je poljoprivredno zemljište u Međimurskoj županiji osrednje humozno sa srednjom vrijednosti udjela **humusa 2,29 %** što je niže od prosjeka prijašnjih godina koji je iznosio 2,35% (Tablica 3.). Na 43 % analiziranih parcela utvrđen je nizak sadržaj humusa što možemo povezati sa dugogodišnjom intenzivnom obradom tla, slabom primjenom organskih gnojiva, nepridržavanjem dobrih poljoprivrednih i ekoloških praksi, ali većim udjelom analiziranih uzoraka sa tala s prirodno nižim humusom.



Grafikon 3. Sadržaj organske tvari (humus %)

Slično kao i kod pH reakcije tla najniže prosječne vrijednosti humusa u tlu imaju općine Podturen i Belica što možemo isto tako pripisati pedogenetskim faktorima (Grafikon 4.). Na tim tlima posebno je važno provoditi mjere sideracije (zelena gnojidba), organske gnojidbe, te prilagoditi obradu tla kako bi se poboljšalo udio humusa u tlu.


Budući da ne postoji mogućnost stvaranja mineralnih rezervi dušika u tlu (npr. gnojidbom na zalihu), dolazi često do problema preniske ili previsoke raspoloživosti dušika. Utvrđene potrebe za dušikom ne predstavljaju potencijalno zagađenje voda nitratima niti predstavljaju ograničenje glede prinosa. Srednja vrijednost potreba čistog dušika u ratarskim kulturama za Međimursku županiju iznosi 113 kg/ha. Preporučene doze dušika poštuju akcijski program zaštite voda od nitrata poljoprivrednog porijekla (Nitratna direktiva), te kao takve nisu opasne za okoliš.



**Grafikon 4.** Srednje vrijednosti humusa (%) po JLS

Kako cilj projekta nije bio samo utvrđivanje potrebnih mjera popravka tla, već obuhvaćanje što više segmenata koji utječu na podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i smanjenje zagađenja okoliša, analitičkim parametrima uključena je i potreba za ishranom bilja, odnosno gnojidba makro elementima fosforom i kalijem. Opravdanost takvog pristupa očituje se u velikoj razlici opskrbljenosti tla fosforom i kalijem, te činjenicom da se balansiranom gnojidbom može postići smanjenje inputa odnosno troška gnojidbe ili povećanje koje prati povećan prinos poljoprivrednih kultura i postupno podizanje pogodnosti tla. U tu svrhu korištena je Al-metoda (Amonijsko laktatna ekstrakcija hranjiva) za dobivanje podataka o količini P i K u tlu. Prema dobivenim podacima srednja vrijednost za  $P_2O_5$  iznosi 26,63 mg/100g (D klasa – bogato opskrbljeno) minimalna izmjerena vrijednost je bila 2,73 mg/100g (A klasa opskrbljenosti) i maksimalna izmjerena vrijednost od 101,25 mg/100g (E klasa opskrbljenosti). Najviše vrijednosti fosfora su bile u općinama Orehovica, Mala Subotica i Belica, a najniže su imale Strahoninec i Podturen. Prosječni  $K_2O$  u tlu je iznosio je 18,86 mg/100g (C klasa - dobro opskrbljeno) minimalna izmjerena vrijednost je bila 3,62 mg/100g (A klasa opskrbljenosti) i maksimalna izmjerena vrijednost od 53,41 mg/100g (E klasa opskrbljenosti). Najviše vrijednosti kalija su bile u općinama Strahoninecu i Svetom Martinu na Muri, a najniže u Orehovici i Goričanu.

## SREDNJE VRIJEDNOSTI FOSFORA I KALIJA U TLU




Grafikon 5. Srednje vrijednosti opskrbljenosti fosfora ( $P_2O_5$ ) i kalija gnojidrom ( $K_2O$ )

Uz dušik, fosfor i kalij su najznačajniji elementi ishrane bilja. Za razliku od dušika, fosforom i kalijem može se gnojiti na zalihu jer su sporo pokretni u tlu i nisu izloženi eroziji. Gnojidba je agrotehnička mjera koja značajno utječe na povećanje produktivnosti. Biljke usvajaju čitav niz elemenata iz tla i/ili atmosfere, a neki, posebice dušik, fosfor i kalij, potrebni su u velikim količinama pa je gnojidba zapravo neizostavna agrotehnička mjera od prvorazrednog značenja. Mnogi hranjivi elementi vraćaju se prirodnim putom u tlo, ali znatan dio ih se odnosi žetvom, dok se jedan dio ispire ili promijeni u nepristupačne oblike za biljke. Ako se tako izgubljeni dio biljnih hranjiva iz tla ne nadoknađuje, tlo siromaši i prinos opada. Iz ukupnih rezervi tla, koje su višestruko veće od potrebe biljaka, jedan dio hranjiva se neprekidno mijenja u oblike povoljne za ishranu bilja (mobilizacija hranjiva), ali se taj proces u pravilu odvija znatno sporije od gubitaka pa se gnojidba javlja kao najvažniji agrotehnička mjera za osiguranje visokih i stabilnih prinosa uz očuvanje efektivne plodnosti tla. Gnojidbu stoga treba smatrati investicijom u biljnu proizvodnju, nikako troškom.


Može se reći da dosadašnja praksa gnojidbe u Međimurskoj županiji prema prikupljenim podacima iz obrasca „Podaci o uzorku tla“ u najmanju ruku ne donosi koristi. Potvrdu toga vidimo u grafikonima 6. i 7. gdje su razine opskrbljenosti lako pristupačnog fosfora i kalija svrstane u klase od A do E. Možemo vidjeti velike razlike po različitim JLS, a samim time veliku neizbalansiranost za potrebama prema gnojidbi usjeva. Tako da pojedine parcele imaju minimalne potrebe za hranjivima od 0 kg/ha, a pojedine parcele maksimalne, najveće dopuštene 130 kg  $P_2O_5$ /ha i 180 (250)  $K_2O$ /ha. Jedan od uzroka neizbalansiranosti hranjiva u

tu je nepravilna i nedovoljna gnojidbena uslijed nepoznavanja stanja hranjiva u tlu. Takav način poimanja ishrane bilja u konačnici rezultira zagađenjem okoliša, smanjenjem plodnosti tla i finansijskim gubitkom poljoprivrednih proizvođača. Analizom tla poljoprivredni proizvođači moći će prilagoditi gnojidbu stvarnom stanju tla i na taj način izbalansirati pristupačna hranjiva, što će dovesti do povećanja prinosa i/ili uštede kod rashoda za gnojidbu.



Grafikon 6. Razina opskrbljenosti fosforom prema klasama (Vukadinović i Lončarić)

### Razina opskrbljenosti kalija prema klasama



Grafikon 7. Razina opskrbljenosti kalijem prema klasama (Vukadinović i Lončarić)

## 4. Zaključak

Parametri tla koje smo analizirali kroz ovaj projekt, a to su kiselost tla, humus, pristupačna hranjiva (fosfor i kalij) i mehanička (fizikalna) svojstva tla, te kroz statističku obradu dobivenih podataka, došli smo do slijedećih zaključaka:

**Kiselost tla**, odnosno niska pH vrijednost i dalje je najvažniji ograničavajući čimbenik plodnosti tla na području Međimurske županije. Preporuka je da se osim edukacija i informiranja poljoprivrednih proizvođača, izrade programi sufinanciranja kalcizacije kao mjere popravka kiselosti tla, u smislu sufinanciranja nabave opreme ili materijala za kalcizaciju.

**Humus** kao jedan od najvažnijih čimbenika plodnosti, tla čiji postotak u tlu utječe na sve procese u razvoju i rastu biljnih kultura, pokazuje da su tla njime prosječno opskrbljena. Kao mjera popravka, preporuča se obavezna i stalna primjena tzv. zelene gnojidbe odnosno sideracijskih usjeva, uporabu stajskog gnoja na oraničnim površinama, te konzervacijska poljoprivreda sa reduciranim obradom tla. „Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama“ i „Konzervacijska poljoprivreda“ su dio Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027, odnosno potpore za eko sheme kao jednogodišnje klimatsko okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja.


**Neuravnotežena bilanca hranjivih tvari u tlu** prisutna je i dalje u velikom postotku analiziranih poljoprivrednih površina. Razlog tome je ukorijenjena šablonizirana gnojidba, bez obzira na dane preporuke gnojidbe, gdje je precizirano određeno koliko je kojeg pojedinog hranjiva potrebno za planiranu kulturu. Rješenje ovog problema je edukacija i informiranje o važnosti managementa gnojidbe, kojom bi se povećala produktivnost, a smanjili troškovi i ekološko opterećenje gnojdbom. To je i jedan od najvažnijih ciljeva održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i proizvodnje.

Mišljenje je kako nam treba više znanja i iskustva u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje, ali ne formalnog već „reproaktivnog znanja“, to jest primjenjivog kojim se mogu uspješno rješavati problemi. Reproaktivno znanje podrazumijeva visoku razinu i potrebno iskustvo za uspješno rješavanje problema, ali i sposobnost njegovog prenošenja na poljoprivredne proizvođače.


Kontrola plodnosti tla osnovni je preduvjet za održivo upravljanje zemljištem i strateška komponenta održivog razvoja poljoprivrede općenito pa tako i na području Međimurske županije. Kako je naša poljoprivreda još uvijek pretežito primarnog karaktera, kvaliteta života i mogućnost ekonomskog razvoja poljoprivrednih proizvođača izravno je povezana s plodnošću tla i veličinom zemljišnih resursa. Stoga je rast proizvodnje hrane, uz zadržavanje i povećanje ekoloških funkcija zemljišta moguć, ali samo ako se zemljišni resursi koriste na odgovarajući način, a za takav odgovoran pristup potrebno je znanje, ali i učinkovit nadzor.

## 5. Prilog – Karte


Prilog 1. Analizirane površine u Međimurskoj županiji za 2023. godini




**Prilog 2.** Analizirane površine u Međimurskoj županiji za razdoblje od 2016 do 2023. godine




**Prilog 3. vrijednost pH u KCl**




**Prilog 2.** vrijednost humusa (%) u tlu



**Prilog 3.** sadržaj lako pristupačnog fosfora u tlu



Prilog 4. sadržaj lako pristupačnog kalija u tlu



**Prilog 5.** Tumačenje rezultata analiza za potrebe ispitivanja plodnosti tla i granične vrijednosti

Reakcija tla pH KCl (klasifikacija prema Thun-u, 1955.)

Kategorija	pH (KCl)	Opis
A	<4,50	Jako kisela reakcija
B	4,51-5,50	Kisela reakcija
C	5,51-6,50	Slabo kisela reakcija
D	6,51-7,20	Neutralna reakcija
E	>7,21	Alkalna reakcija

Interpretacijske vrijednosti za humoznost tla

Vrijednost humusa (%)	Opis
<0,5	Ekstremno slabo humozno tlo
0,51-1,00	Vrlo slabo humozno tlo
1,01-2,00	Slabo humozno tlo
2,01-3,00	Srednje humozno tlo
3,01-5,00	Dosta humozno tlo
5,01-10,00	Jako humozno tlo
10,01-30,00	Vrlo jako humozno tlo
>30,01	Tresetno tlo

Interpretacijske vrijednosti za sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalija po AL-metodi (klasifikacija prema Vukadinoviću i Lončariću)

Klasa opskrbljenosti		mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> u 100g tla		mg K <sub>2</sub> O u 100 g tla		
		Ph < 6 (KCl)	pH > 6 (KCl)	Tlo lakše teksture	Tlo srednje teške tekture	Tlo teške tekture
A	Vrlo slabo opskrbljeno	<8,00	<5,00	<6,00	<8,00	<10,00
B	Slabo opskrbljeno	8,01-16,00	5,01-12,00	6,01-12,00	8,01-14,00	10,01-16,01
C	Dobro opskrbljeno	16,01-25,00	12,01-20,00	12,01-24,00	14,01-28,00	16,01-32,00
D	Bogato opskrbljeno	25,01-45,00	20,01-30,00	24,01-35,00	28,01-40,00	32,01-45,00
E	Vrlo bogato opskrbljeno	>45,01	>30,01	>35,01	>40,01	>45,01

\* Tlo lakše tekture: pjesak, ilovasti pjesak, pjeskovita ilovača

\*Tlo srednje teške tekture: pjeskovito glinasta ilovača, prah, praškasta ilovača, ilovača, glinasta ilovača, praškasto glinasta ilovača

\*Tlo teške tekture: pjeskovita glina, praškasta glina, teška glina